



Spätfolge einer Infektion

Am Unterarm entsteht ein knotiger Strang

Anamnese

Ein 83-jähriger, fitter Patient stellte sich mit Rötungen über den streckseitigen Gelenkfalten der Langfinger der rechten Hand vor. Er fühlte sich nicht krank, fand aber das langsam aufgetretene, einseitige Phänomen sehr spannend.

Eine internistische Durchuntersuchung, insbesondere im Hinblick auf eine atypische Dermatomyositis oder ein paraneoplastisches Geschehen, blieb völlig ergebnislos. Nach etwa einem Jahr kam der weiterhin gesund wirkende Mann wieder in die Praxis. Bei ihm hatte sich nun ein livider, derber, subkutaner Strang ulnar vom Handgelenk fast bis zum Ellbogen entwickelt (**Abb. 1**). Auch die Hautphänomene an der rechten Hand bestanden weiterhin (**Abb. 2**).

Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?



Abb. 1: Livider, derber, subkutaner Strang am Unterarm.

© G. Müller-Jörgen



Abb. 2: Rötungen an den Fingergelenken.

© G. Müller-Jörgen

Zur Auflösung bitte umblättern



Blickdiagnosen auf springermedizin.de

Weitere Fälle, bei denen Ihr diagnostischer Spürsinn gefragt ist, stehen für Sie online in der Rubrik „Blickdiagnose interaktiv“ bereit:
www.springermedizin.de/blickdiagnose-interaktiv