Mastzellen
könnten sich
vielleicht als
Biomarker
eignen.

großer Tumoren), umso mehr Blutgefäße sprossen aus. Schließlich hat der niedrige Sauerstoffgehalt einen immunsuppressiven Effekt. Deshalb versuchen Forscher, die Bedingungen in In-vitro-Modellen nachzustellen, um auf dieser Basis etwa neue Therapiestrategien zu entwickeln. Es hat sich gezeigt, dass Hypoxie ein unabhängiger Marker für eine schlechte Prognose etwa bei Patienten mit Brustkrebs, nicht kleinzelligem Lungenkarzinom, Ovarial- oder Zervixkarzinom ist [McDonald PC et al. Front Cell Dev Biol. 2016;4:27].

Einen Hinweis auf eine schlechte Prognose liefern auch Mastzellen im TME, die das Enzym Tryptase ausschütten. Diese tumorinfiltrierenden Zellen könnten sich einer Metaanalyse zufolge vielleicht als Biomarker eignen. In der Studie war der Nachweis von Mastzellen, die tryptasepositiv waren, mit einer schlechteren Prognose assoziiert [Hu G et al. Int J Cancer. 2017; <https://doi.org/10.1002/ijc.31099>]. Eine mögliche Erklärung für die Assoziation ist, dass diese Zellen in den Tumoren unter anderem eine immunsuppressive Umgebung schaffen. Zudem sezernieren sie Enzyme, die die extrazelluläre Matrix abbauen und dadurch das Eindringen von Tumorzellen in das Stroma erleichtern. Weil sie das Gleichgewicht im TME dadurch empfindlich stören, wird das Tumorwachstum gefördert und letztlich

die Prognose der Patienten verschlechtert. Entsprechend nehmen Wissenschaftler bei der Entwicklung neuer Krebstherapien seit einiger Zeit verstärkt auch Mastzellen in den Blick.

Netzwerk aus Proteinen und Glukosaminoglykanen

All die zellulären Elemente des TME sind in die extrazelluläre Matrix eingebettet, einem Netzwerk aus Proteinen (Kollagene, Proteoglykane) und Glukosaminoglykanen. Sie geben nicht nur die Struktur vor, die eine mechanische Barriere für Immunzellen sein kann, sondern sind auch Schlüsselsubstanzen für Entzündungsprozesse und die Krebsentwicklung [Nikitovic D et al. Front Immunol. 2015;6:169]. Während eines Entzündungsvorganges können die Moleküle der extrazellulären Matrix die Gewebearchitektur remodellieren. Als ein wichtiges Molekül der Matrix hat sich etwa die Hyaluronsäure erwiesen, die in Vorgänge der Entzündung, der Blutgefäßbildung und in tumorfördernde Prozesse involviert ist. Sie reguliert das Einwandern von Entzündungszellen ins TME sowie die Freisetzung inflammatorischer Zytokine. Dadurch wird letztlich der Entzündungsprozess in der betroffenen Region geschwächt, etwa durch Bindung der Hyaluronsäure an das Adhäsionsmolekül ICAM-1. *Peter Leiner*

Neue Themenfelder für die TME-Forschung

Die Erforschung des Tumormicroenvironments (TME) ist im vergangenen Jahrzehnt weit vorangekommen und hat eine ungeheure Heterogenität dieses Kompartiments zutage gefördert. Bisher haben sich die Wissenschaftler im Wesentlichen nur auf zwei Pole konzentriert. Der eine besteht aus der Gefäßversorgung der Tumoren, der extrazellulären Matrix sowie aus der Erforschung der Metastasierung, den anderen Pol bilden das Immunsystem und die Entwicklung von Immuntherapien. Wie es im aktuellen Weißbuch des seit zehn Jahren bestehenden TME-Netzwerks vom US-amerikanischen Nationalen Krebsinstitut heißt, hat es bisher jedoch nur wenig Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern der beiden Forschungsschwerpunkte gegeben [DeClerck YA et al. Cancer Res. 2017;77(5):1051-9]. Teile des Netzwerks sind unter anderem das Massachusetts Institute of Technology, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center und die Stanford-Universität. Um künftigen Herausforderungen in der TME-Forschung begegnen zu können, müssten die Forschungsgebiete ausgeweitet und neue Themen wie Bildgebung mithilfe der Mikroskopie, der Magnetresonanztomografie oder der Positronenemissionstomografie zur Erfassung räumlicher und zeitlicher Veränderungen des TME, die Ernährung, der Stoffwechsel und selbst

© photos.com PLUS

Umweltwissenschaften berücksichtigt werden. Noch besser aufgeklärt werden muss z. B. der Einfluss der Makroumgebung von Tumoren auf das TME, wie es im Weißbuch heißt. Dabei handelt es sich um ein vom Tumor räumlich entferntes Netzwerk, das zum Beispiel dafür sorgt, dass Metastasen Nischen zur Absiedelung finden. Ein wichtiges Beispiel für ein noch gar nicht berücksichtigtes Forschungsgebiet sind nach Angaben des Netzwerks das sympathische Nervensystem und sein Einfluss auf das TME, die Tumorentstehung und dessen Progression. *Peter Leiner*