


## Erratum to: What to Do, and What Not to Do, When Diagnosing and Treating Breakthrough Cancer Pain (BTcP): Expert Opinion

Working Group Nientemale DEI · R. Vellucci<sup>1</sup>  · G. Fanelli<sup>2</sup> · R. Pannuti<sup>3</sup> · C. Peruselli<sup>4</sup> · S. Adamo<sup>5</sup> · G. Alongi<sup>6</sup> · F. Amato<sup>7,8</sup> · L. Consoletti<sup>9</sup> · L. Lamarca<sup>10</sup> · S. Liguori<sup>11</sup> · C. Lo Presti<sup>12</sup> · A. Maione<sup>13</sup> · S. Mameli<sup>14</sup> · F. Marinangeli<sup>15</sup> · S. Marulli<sup>16</sup> · V. Minotti<sup>17</sup> · D. Miotti<sup>18</sup> · L. Montanari<sup>19,20</sup> · G. Moruzzi<sup>21</sup> · S. Palermo<sup>22</sup> · M. Parolini<sup>23</sup> · P. Poli<sup>24</sup> · W. Tirelli<sup>25,26</sup> · A. Valle<sup>27</sup> · P. Romualdi<sup>28</sup>

Published online: 7 April 2016  
© Springer International Publishing Switzerland 2016

### Erratum to: Drugs (2016) 76:315–330 DOI 10.1007/s40265-015-0519-2

Page 324, Table 1, which previously appeared as:

**Table 1** Characteristics of opioids used for BTP (times in minutes)

	Analgesic onset	Availability	Dwell time
Oral morphine	30–45'	30	NA
Oral oxycodone	30–45'	40–50	NA
OTFC	15–30	50	15
FBT	15	65	15
SLF	10–15	70	2
FBSF	15	65	2–5
INFS	5–10	80–90	NA
FPNS	5–10	70	NA

BTP breakthrough pain, FBT fentanyl buccal tablet, FBSF fentanyl buccal soluble film, FBNS fentanyl pectyn nasal spray, INFS intranasal fentanyl spray, OTFC oral transmucosal fentanyl cytrate, SLF sublingual fentanyl

The online version of the original article can be found under doi:10.1007/s40265-015-0519-2.

✉ R. Vellucci  
renato.vellucci@gmail.com

- 1 SOD Cure Palliative e Terapia del Dolore, Ospedale Universitario Careggi, Florence, Italy
- 2 SC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Parma, Italy
- 3 Fondazione ANT Italia Onlus, Andria, Italy
- 4 SC Cure Palliative, Ospedale di Biella, Ponderano, BI, Italy
- 5 UO Terapia del Dolore, ARNAS Civico di Palermo, Palermo, Italy
- 6 Hospice e Cure Palliative, ASP Idi Agrigento, Agrigento, Italy

Should appear as:

**Table 1** Characteristics of opioids used for BTP (times in minutes)

	Analgesic onset	Availability	Dwell time
Oral morphine	30–45'	30	NA
Oral oxycodone	30–45'	40–50	NA
OTFC	15–30	50	15
FBT	15	65	15
SLF	10–15	70	2
FBSF	15	65	2–5
INFS	5–10	80–90	NA
FPNS	5–10	70	NA
FCSL	6	~70	NA

BTP breakthrough pain, FBT fentanyl buccal tablet, FBSF fentanyl buccal soluble film, FBNS fentanyl pectin nasal spray, INFS intranasal fentanyl spray, OTFC oral transmucosal fentanyl citrate, SLF sublingual fentanyl, FCSL fentanyl citrate sublingual

- 7 UOC Terapia del Dolore e Cure Palliative, Azienda ospedaliera di Cosenza, Cosenza, Italy
- 8 Past President Feder Dolore-SICD, Cosenza, Italy
- 9 Struttura di Medicina del Dolore, Ospedale Universitario “Ospedali Riuniti”, Foggia, Italy
- 10 UOS Cure Palliative e Terapia Antalgica, Azienda ULSS N. 10 “Veneto Orientale”, San Donà di Piave, VE, Italy
- 11 USC Cure Palliative Terapia del Dolore, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy
- 12 UOD Terapia del Dolore e Cure Palliative, ACO San Filippo Neri, ASLRME, Rome, Italy

- 
- <sup>13</sup> Terapia antalgica e Cure Palliative, Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà”, Nola, NA, Italy
- <sup>14</sup> SC Terapia del Dolore, Presidio Ospedaliero “A. Businco”, Cagliari, Italy
- <sup>15</sup> Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Università dell’Aquila, L’Aquila, Italy
- <sup>16</sup> OC Anestesia, Rianimazione e Terapia Iperbarica, UOS-I Gruppo Operatorio, Ospedale “Vito Fazzi”, Lecce, Italy
- <sup>17</sup> SC Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera “S.M. della Misericordia”, Perugia, Italy
- <sup>18</sup> UO Cure Palliative e Terapia del Dolore, Fondazione Salvatore Maugeri-IRCCS, Pavia, Italy
- <sup>19</sup> UO Semplice Cure Palliative, Ravenna, Italy
- <sup>20</sup> Dipartimento Onco-ematologico, AUSL della Romagna c/o Presidio Ospedaliero Umberto I, Lugo di Ravenna, Italy
- <sup>21</sup> UOS Hospice, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Siracuse, Italy
- <sup>22</sup> UOC Terapia Antalgica, IRCCS San Martino-IST, Genoa, Italy
- <sup>23</sup> UOC Anestesia e Rianimazione B, Azienda Universitaria integrata di Verona, Verona, Italy
- <sup>24</sup> UO Terapia del Dolore, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italy
- <sup>25</sup> Centro di Terapia del Dolore, Hospice “Fondazione Roma Sanità”, Rome, Italy
- <sup>26</sup> Centro di Rianimazione e Terapia del Dolore e Cure Palliative, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, Rome, Italy
- <sup>27</sup> Fondazione FARO, Turin, Italy
- <sup>28</sup> Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Alma mater studiorum, Università di Bologna, Bologna, Italy