Erratum a: La sindrome da carcinoide

Roberto Baldelli¹ · Valerio Renzelli² · Francesca Rota¹ · Paola Di Giacinto¹ · Antonio Bianchi³ · Laura Rizza¹ · Paolo Zuppi¹

Pubblicato online: 10 febbraio 2020
© Springer Nature Switzerland AG 2020

Erratum to: L'Endocrinologo

<https://doi.org/10.1007/s40619-020-00653-y>

La versione originale di questo articolo purtroppo conteneva un errore. I nomi di due farmaci sono stati erroneamente inseriti nella tabella al momento della pubblicazione iniziale.

La tabella corretta è riportata di seguito e la tabella dell'articolo originale è stata aggiornata.

L'editore desidera scusarsi per questo errore.

Nota della casa editrice Springer Nature rimane neutrale in riguardo alle rivendicazioni giurisdizionali nelle mappe pubblicate e nelle affiliazioni istituzionali.

QUADRO SINOTTICO DEI FARMACI CITATI

Principio attivo	Nomi commerciali	Dosaggi
Octreotide	Sandostatina	fl 50 mcg/ml, 100 mcg/ml, 500 mcg/ml; sc, ev
Octreotide LAR	Sandostatina LAR	1 fl 10 mg, 20 mg, 30 mg; im (ogni 28 giorni)
Lanreotide	Ipstyl	1 fl 60 mg, 90 mg, 120 mg; im (ogni 14, 21, 28 giorni)
Telotristat	Xermelo	cp 250 mg; os
Pasireotide	Signifor	fl 0,3 mg, 0,6 mg, 0,9 mg; sc
Everolimus	Afinitor	cp 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; os
¹⁷⁷ Lu-DOTATATE	Lutathera	fl 370 MBq/mL; ev
¹³¹ I-MIBG	Iobenguano ¹³¹ I	fl 185 MBq/mL, 246,7 MBq/mL, 493,3 MBq/mL; ev

Per l'elenco completo dei farmaci citati e le relative schede tecniche si rimanda al prontuario dei farmaci. *os*, orale; *sc*, sottocutaneo; *ev*, endovena; *im*, intramuscolo; *cp*, compresse; *fl*, fiale

The original article can be found online at <https://doi.org/10.1007/s40619-020-00653-y>

✉ R. Baldelli
r.baldelli@scf.gov.it; roberto.baldelli@uniroma1.it

¹ Unità di Endocrinologia, A.O. San Camillo-Forlanini, Roma, Italia

² Unità di Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, "Sapienza" Università di Roma, A.O. S. Andrea, Roma, Italia

³ Unità di Endocrinologia, Università Cattolica "Sacro Cuore", Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia