Zbl Arbeitsmed 2021 · 71:203
<https://doi.org/10.1007/s40664-021-00427-9>
Online publiziert: 12. April 2021
© Springer-Verlag GmbH 2021

G. M. Oremek · K. Passek · M. H. Bendels · D. Ohlendorf

Abt. Labordiagnostik, Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin,
Universitätsklinikum, Goethe Universität-Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland

Erratum zu: Einflussgrößen auf die Bestimmung des Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) bei pulmonalen und extrapulmonalen Erkrankungen

Erratum zu:

Zbl Arbeitsmed 2020

<https://doi.org/10.1007/s40664-020-00407-5>

Die Stabilität von ACE bei 20–25 °C liegt bei 1 Tag und nicht bei 30 Tagen.

Dazu finden Sie Angaben in der Literatur zu den Nummern 2, 3, 21.

Der korrigierte Absatz lautet folgendermaßen:

Präanalytik

ACE-Hemmer, z. B. Captopril, müssen 4 Wochen vor Probennahme abgesetzt werden. Die Lagerstabilität im Serum bzw. Heparinplasma beträgt:

- bei 20–25 °C: 1 Tag,
- bei 4–8 °C: 30 Tage,
- bei –20 °C: 6 Monate.

Korrespondenzadresse

G. M. Oremek

Abt. Labordiagnostik, Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin,
Universitätsklinikum, Goethe Universität-Frankfurt
Frankfurt am Main, Deutschland
gerhard-maximilian.oremek@kgu.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s40664-020-00407-5>
zu finden.