Michael Krebs

Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel, Klinik für Innere Medizin III, Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich

Abklärung bei Polyurie

SOP Durstversuch

Indikation

Differenzialdiagnose (DD) der Polydipsie und Polyurie mit verdünntem Harn: Diabetes insipidus centralis, Diabetes insipidus renalis oder psychogene Polydipsie.

Definition

Polyurie: Urinproduktion > 3 l pro Tag, osmotische Diurese: z. B. Hyperglykämie bei Diabetes mellitus, Polyurie bei verdünntem Harn: Primäre Polydipsie oder Diabetes insipidus.

Anamnese

Pharmaka, die die Diurese beeinflussen? Ein nephrogener Diabetes insipidus (DI) wird bei Erwachsenen meistens durch eine Lithiumtherapie oder eine Hyperkalzämie ausgelöst. Beginn der Symptome (v. a. Nykturie) beim zentralen DI abrupt, bei primärer Polydipsie eher graduell.

Screening

Elektrolyte im Serum, Plasmaosmolalität, Harnosmolalität

- Normale Natriumkonzentration bei Harnosmolalität > 600 (–800) mosmol/kg: klinisch relevanter DI ausgeschlossen
- Hyponatriämie (>145 mmol/l) bei verdünntem Harn (Harnosmolalität geringer als Plasmaosmolalität): Diabetes insipidus gesichert
- Hyponatriämie (<137 mmol/l) bei verdünntem Harn (weniger als die Hälfte der Plasmaosmolalität): primäre Polydipsie

Testprinzip Durstversuch

Bei Flüssigkeitskarenz sinkt durch ADH-Ausschüttung die Diurese, die Harnosmolalität steigt, wohingegen die Plasmaosmolalität konstant bleibt. Bei einer Plasmaosmolalität > 295–300 mosmol/kg oder einer Serumnatriumkonzentration > 145 mmol/l ist die ADH-Wirkung auf die Niere maximal. Bei Vorliegen eines Diabetes insipidus (zentral und renal) ist die Regulation gestört und bei länger bestehender psychogener Polydipsie beeinträchtigt.

Abbruchkriterien: Der Durstversuch wird fortgesetzt, bis eines der genannten Kriterien erreicht wird:

1. Die Harnosmolalität erreicht einen normalen Wert: >600 (–800) mosmol/kg.
2. Die Harnosmolalität erreicht ein Plateau über 2–3 Messungen, während die Plasmaosmolalität weiter steigt.
3. Die Plasmaosmolalität steigt über ≥295–300 mosmol/kg, und/oder Serum-Na steigt über >145 mmol/l.
4. Gewichtsverlust > 3 % des Ausgangsgewichts.
5. Erheblicher Blutdruckabfall mit Kreislaufdysregulation oder Pulsanstieg.

Nur bei Nachweis eines Diabetes insipidus (= Erreichen der Kriterien 2., 3. oder 4.) wird zusätzlich untersucht, ob die Niere auf das synthetische ADH-Analogon DDAVP anspricht (DD: DI renalis).

Standardtest

Der Test beginnt am Morgen (ca. 8 Uhr). Der Patient darf ein leichtes Frühstück zu sich nehmen, Flüssigkeit ad libitum, kein Kaffee. Der Patient muss kontinuier-

lich unter Observanz sein. Test erklären und „persönlichen“ Harnsammelbehälter aushändigen.

- Der Patient wird gewogen und eine Blutentnahme sowie Urinprobe zur Bestimmung der Plasma- und Harnosmolalität (Ausgangswerte) sowie der Plasmanatriumkonzentration gewonnen. Bestimmung der ADH- oder Copeptinkonzentration am Beginn und bei Abbruch (■ Abb. 1).
- Während der bis zu 12-stündigen Durstphase werden stündlich Harnmenge, Harnosmolalität, Serumnatrium, Plasmaosmolalität, Körpergewicht, Puls, Blutdruck (NACH der Harnabgabe) gemessen. Bei uns hat sich zusätzlich zum Versand der Proben ins Labor ein „Online“-Monitoring der Elektrolyte mittels Blutgasanalysegerät bewährt, um einen möglichen raschen Anstieg der Natriumkonzentration nicht zu übersehen.
- Am Ende des Tests werden Harnosmolalität, Elektrolyte, Serumnatrium, ADH/Copeptin, Körpergewicht, Puls, Blutdruck gemessen.
- Dann werden bei Diagnose eines Diabetes insipidus 4 µg Desmopressin (Minirin®) s. c. oder i. v. verabreicht und die Harnosmolalität nach 1 und 2 h gemessen.

Bewertung

Um die Auswertbarkeit des Tests nicht zu gefährden, darf Desmopressin erst verabreicht werden, wenn das Vorliegen eines Diabetes insipidus festgestellt wurde (Abbruchkriterien 2 und/oder 3 erfüllt).

- Diabetes insipidus centralis:
 - Copeptin ist in der Gegenwart einer klaren Hyperna-

PROTOKOLL

ADH / Copeptin	Vorwert:	Abbruchwert:	oder am Ende von Periode (10):
-------------------	----------	--------------	-----------------------------------

	Harn		Plasma			
Stunde	Volumen (ml)	Osmolalität (mosmol/l)	Osmolalität (mosmol/l)	Na ⁺ (mmol/l)	Hk (%)	Körpergewicht (kg)
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Abbruch	siehe Kriterien					
Gabe von 4 µg DDAVP	Falls DI bestätigt					
1h nach DDAVP						
2h nach DDAVP						

Abb. 1 ◀ Protokoll des Durstversuchs

triämie (>146 mmol/l) niedrig (<4,9 pmol/l)

- Partiiell: Anstieg der Harnosmolalität 15–50 % nach DDAVP
- Komplet: Anstieg der Harnosmolalität 50–100 % nach DDAVP
- Diabetes insipidus renalis
- Copeptin ist klar erhöht (>21,4 pmol/l)

- Partiiell: geringer Anstieg der Harnosmolalität nach DDAVP
- Komplet: kein Anstieg der Harnosmolalität nach DDAVP
- Primäre Polydipsie:
 - Bei langdauernder psychogener Polydipsie mit extremen Trinkmengen kommt es zu einer Ausschwemmung des renalen Salzgradienten und damit trotz

adäquater ADH-Freisetzung zu einer verminderten maximalen Konzentrationsfähigkeit des Harns (500–600 mosmol/l) im Gegensatz zu >800 mosmol/l bei Gesunden.

Korrespondenzadresse

Ao. Univ.-Prof. Dr. M. Krebs
Abteilung für Endokrinologie
und Stoffwechsel, Klinik
für Innere Medizin III,
Medizinische Universität
Wien
Währinger Gürtel 18–20,
1090 Wien, Österreich
michael.krebs@
meduniwien.ac.at

Funding. Open access funding provided by Medical University of Vienna.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. M. Krebs gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine von den Autoren durchgeführten Studien an Menschen oder Tieren.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Auf dem Weg zu einem individualisierten Therapiekonzept für Diabetespatienten mit Atherosklerose

Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) identifizieren einen neuen Weg, arteriosklerotische Herzerkrankungen bei Diabetikern zu vermindern/bekämpfen/verringern

Die Hauptursache für die erhöhte Sterblichkeit bei Diabetespatienten ist die Atherosklerose und damit verbundene Komplikationen wie Myokardinfarkt, Schlaganfall und periphere arterielle Verschlusskrankheit. Während der aggressivere Krankheitsverlauf der Atherosklerose bei diabetischen Patienten wohl bekannt ist, bleiben die zugrundeliegenden Mechanismen unklar. Daher fehlen spezifische Ansätze zur Therapie der Atherosklerose bei diabetischen Patienten.

Ein Kennzeichen der Diabetes-assoziierten Atherosklerose ist eine Verschlimmerung der Gefäßverengung trotz deutlicher Verbesserung des Blutzuckerspiegels. Dieses Phänomen, welches als hyperglykämisches Gedächtnis bezeichnet wird, ist für Patienten und Ärzte gleichermaßen enttäuschend.

Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Dr. Berend Isermann und Dr. Khurram Shahzad vom Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie der OVGU und des Magdeburger Gesundheitscampus Immunologie, Infektiologie und Inflammation (GC-I³) haben nun einen neuen Mechanismus aufgeklärt, der dem hyperglykämischen Gedächtnis zugrunde liegt. Sie stellten fest, dass Makrophagen (Entzündungszellen), die sich in den atherosklerotischen Plaques anreichern, vermehrt das Redox-Protein p66Shc exprimieren, und daher auch vermehrt reaktive Sauerstoffspezies (ROS, oxidativer Stress) bei Diabetes mellitus erzeugt werden. ROS verändert die Protein- und damit die Zellfunktion. Wichtig ist, dass dieses Protein spezifisch nur in den Makrophagen von diabetischen Mäusen oder Diabetespatienten exprimiert wird. Die Expression von p66Shc und damit die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies blieb trotz Normalisierung der Blutglukosespiegel hoch. Damit konnten die Wissenschaftler erstmals ein Protein nachweisen, dass das hyperglykämische Gedächtnis verursacht.

Aber die Wissenschaftler identifizierten nicht nur diesen neuen Mechanismus, sondern konnten auch neue therapeutische Ansätze aufzeigen. So konnten sie zeigen, dass die Gerinnungsprotease aktiviertes Protein C die Diabetes-spezifischen Veränderungen aufhebt. Dies stellt sicher, dass der neu identifizierte Mechanismus therapeutisch nutzbar ist.

“Die Herausforderung ist nun, diese Ergebnisse in größeren klinischen Studien zu bestätigen“, sagt Prof. Isermann. Dr. Shahzad fügt hinzu: “Parallel werden wir Untersuchungen durchführen, um diesen Mechanismus therapeutisch zu nutzen“. Die Forscher hoffen, dass diese Erkenntnisse zu einem individualisierten Therapiekonzept für diabetische Patienten mit Atherosklerose führen.

Originalpublikation:

Khurram Shahzad, Ihsan Gadi, Sumra Nazir, Moh'd Mohanad Al-Dabet, Shrey Kohli, Fabian Bock, Lukas Breitenstein, Satish Ranjan, Tina Fuchs, Zuhir Halloul, Peter. P. Nawroth, Pier Giuseppe Pelicci, Ruediger C. Braun-Dullaeus, Eric Camerer, Charles T. Esmon & Berend Isermann (2018) Activated protein C reverses epigenetically sustained p66Shc expression in plaque-associated macrophages in diabetes. *Communications Biology* (<https://doi.org/10.1038/s42003-018-0108-5>)

**Quelle: Universitätsklinikum
Magdeburg, www.med.uni-magdeburg.de**